

REAKCJA NA CZAS RATUJE ŻYCIE!



www.odetchnijspokojnie.pl

ANAFILAKSJA = ZABÓJCA

ANAFILAKSJA

to nagle
rozwijająca się ciężka
reakcja alergiczna.

Objawy anafilaksji to: swędząca pokrzywka,
obrzęk ust, języka, chrypka, nudności, kurczowe
bóle brzucha, biegunka, duszność, kaszel, świsty,
zawroty głowy, osłabienie, omdlenie.

Objawy mogą wystąpić jednocześnie.

Konieczna szybka pomoc!

CO KAŻDY Z NAS POWINIEN WIEDZIEĆ?

Kto jest zagrożony anafilaksją?

Każdy. Szczególnie alergicy uczuleni na pokarmy
(np. orzechy, owoce morza, mleko, jajka), jady owadów, leki.

Kiedy może wystąpić anafilaksja?

Najczęściej natychmiast po kontakcie z alergenem.

Gdzie to może się zdarzyć?

Wszędzie, np.: w domu, u znajomych, w restauracji, szkole,
przedszkolu, w samochodzie, autobusie, w samolocie.

Jak postępować?

1. Wstrzyknąć sobie adrenalinę domięśniowo (jeśli ją masz).
2. Wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999, 112).
3. Zawołać po pomoc (najbliższa osoba z otoczenia).

ANAFILAKSJA MOŻE BYĆ ŚMIERTELNA

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Konieczna diagnostyka alergologiczna (!) celem rozpoznania
przyczyny. Należy zastosować się do zaleceń specjalisty
alergologa, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu anafilaksji.

Anafilaksja może być łagodna, ale może być śmiertelna.

Jeśli miałeś anafilaksję, nos ze sobą adrenalinę.

Opracowała prof. dr. hab. n. med. Barbara Rogala, 2014.

Rekomendowane przez



Polfa Warszawa S.A.

Grupa

